

**BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE**  
**STI – ARTS APPLIQUES**

**MATHÉMATIQUES**  
**SESSION 2003**

*Durée : 2 heures*

*Coefficient : 2*

*CALCULATRICE AUTORISÉE*

**FOURNITURES :**

- FORMULAIRE OFFICIEL
- DEUX FEUILLES DE PAPIER MILLIMÉTRÉ

*Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.*  
*Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1 à 3*

### EXERCICE 1 (8 points)

Dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 1cm, placer les quatre points  $A(5;0)$ ,  $B(0;3)$ ,  $A'(-5;0)$  et  $B'(0;-3)$ .

1. Donner l'équation de l'ellipse  $(E)$  de centre  $O$  et d'axes  $AA'$  et  $BB'$ .
2. Montrer que si le point  $M(x;y)$  est sur  $(E)$ , alors  $M_1(-x;y)$ ,  $M_2(-x;-y)$  et  $M_3(x;-y)$  sont aussi sur  $(E)$ .
3. Tracer l'ellipse  $(E)$ .
4. Calculer les coordonnées des deux foyers  $F$  et  $F'$ , les placer.
5. On donne  $M\left(3; \frac{12}{5}\right)$ .
  - a) Calculer les longueurs  $MF$ ,  $MF'$  puis  $MF + MF'$ .
  - b) Que remarque t-on ?

## EXERCICE 2 (12 points)

Soit la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $]-4;10[$  par  $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 15}{x + 4}$  et  $(C)$  sa courbe représentative dans un repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 1 cm.

### Partie A :

1. Déterminer la limite de la fonction  $f$  en  $-4$ .
2. En déduire l'existence d'une asymptote à la courbe  $(C)$  dont on précisera une équation.

### Partie B

1. Vérifier que la dérivée  $f'$  de la fonction  $f$  est définie par  $f'(x) = \frac{(x+1)(x+7)}{(x+4)^2}$ . Étudier son signe et dresser le tableau de variation de la fonction  $f$ .
2. Calculer les coordonnées des points d'intersection de la courbe  $(C)$  avec les axes du repère.
3. Déterminer une équation de la tangente  $(T)$  à la courbe  $(C)$  au point  $M$  d'abscisse 2.
4. Tracer dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  la courbe  $(C)$ , la tangente  $(T)$  et l'asymptote.

### Partie C

1)a). Montrer que  $f(x) = x - 6 + \frac{9}{x+4}$

b) En déduire une primitive  $F$  de  $f$  sur  $]-4;10[$ .

3. Calculer en  $\text{cm}^2$  l'aire du domaine limité par la courbe  $(C)$ ; l'axe des abscisses et les droites d'équations  $x = -3$  et  $x = 5$ . On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à  $10^{-2}$  près.

## FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES

### I. STATISTIQUE (SÉRIES STL, STT)

Moyenne, variance, écart type

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i ; V(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\bar{x})^2$$

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)}$$

Dans le cas d'un regroupement en classes :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^p n_i x_i ; V(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^p n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^p n_i x_i^2 - (\bar{x})^2$$

### II. PROBABILITÉS

Si  $A$  et  $B$  sont incompatibles :  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Dans le cas général :  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) ; P(\Omega) = 1 ; P(\emptyset) = 0$$

Dans le cas équiprobable :  $P(A) = \frac{\text{Nombre d'éléments de } A}{\text{Nombre d'éléments de } \Omega}$

### III. ALGÈBRE

#### A. SUITES ARITHMÉTIQUES, SUITES GÉOMÉTRIQUES

Suites arithmétiques

Premier terme  $u_0$  ;  $u_{n+1} = u_n + a$  ;  $u_n = u_0 + na$

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Suites géométriques

Premier terme  $u_0$  ;  $u_{n+1} = bu_n$  ;  $u_n = u_0 b^n$

$$\text{Si } b \neq 1, \quad S_n = 1 + b + b^2 + \dots + b^n = \frac{1 - b^{n+1}}{1 - b}$$

$$\text{Si } b = 1, \quad S_n = n + 1$$

#### B. IDENTITÉS REMARQUABLES

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 ; (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

#### C. ÉQUATION DU SECOND DEGRÉ

Soient  $a, b, c$  des nombres réels,  $a \neq 0$ , et  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

L'équation  $ax^2 + bx + c = 0$  admet :

- si  $\Delta > 0$ , deux solutions réelles

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- si  $\Delta = 0$ , une solution réelle double

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

- si  $\Delta < 0$ , aucune solution réelle.

Si  $\Delta \geq 0$ ,  $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

## IV. ANALYSE

### A. PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DES FONCTIONS USUELLES

#### 1. Fonctions logarithme et exponentielle

$$\ln 1 = 0$$

$$\text{Si } x \in ]-\infty, +\infty[ \text{ et } y \in ]0, +\infty[,$$

$$a^x = e^{x \ln a} \quad (a > 0)$$

$$\ln e = 1$$

$$y = \exp x = e^x \text{ équivaut à } x = \ln y$$

$$(e^a)^b = e^{ab}$$

$$\ln ab = \ln a + \ln b$$

$$e^0 = 1$$

$$\ln a^x = x \ln a$$

$$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$

$$e^{a+b} = e^a e^b$$

$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$$

#### 2. Fonctions puissances

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x} \quad (x > 0)$$

$$x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta$$

$$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$$

$$x^0 = 1$$

$$x^{\alpha-\beta} = \frac{x^\alpha}{x^\beta}$$

$$\text{Si } n \in \mathbb{N}^*, x \in [0, +\infty[ \text{ et } y \in [0, +\infty[,$$

$$y = \sqrt[n]{x} \text{ équivaut à } x = y^n$$

### B. LIMITES USUELLES DE FONCTIONS

#### Comportement à l'infini

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\text{Si } \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty ; \quad \text{si } \alpha < 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$$

#### Comportement à l'origine

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$$

$$\text{Si } \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = 0 ; \quad \text{si } \alpha < 0, \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha = +\infty$$

#### Croissances comparées à l'infini

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty, n \text{ entier naturel}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0, n \text{ entier naturel non nul}$$

C. DÉRIVÉES ET PRIMITIVES (Les formules ci-dessous peuvent servir à la fois pour calculer des dérivées et des primitives)

1. Dérivées et primitives des fonctions usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	Intervalle de validité
$k$	$0$	$]-\infty, +\infty[$
$x$	$1$	$]-\infty, +\infty[$
$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$nx^{n-1}$	$]-\infty, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$	$]0, +\infty[$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$
$e^x$	$e^x$	$]-\infty, +\infty[$

(SÉRIES F12, STL)

$\cos x$	$-\sin x$	$]-\infty, +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$]-\infty, +\infty[$

2. Opérations sur les dérivées

$$(u+v)' = u' + v'$$

$$(ku)' = ku'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$(v \circ u)' = (v' \circ u)u'$$

$$(e^u)' = e^u u'$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}, \quad u \text{ à valeurs strictement positives}$$

$$(u^\alpha)' = \alpha u^{\alpha-1} u'$$

D. CALCUL INTÉGRAL (SÉRIES F12, STT)

Formule fondamentale

Si  $F$  est une primitive de  $f$ , alors  $\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$

Formule de Chasles

$$\int_a^c f(t)dt = \int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt$$

$$\int_b^a f(t)dt = -\int_a^b f(t)dt$$

Linéarité

$$\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t))dt = \alpha \int_a^b f(t)dt + \beta \int_a^b g(t)dt$$

Positivité

Si  $a \leq b$  et  $f \geq 0$ , alors  $\int_a^b f(t)dt \geq 0$ .

Intégration d'une inégalité

Si  $a \leq b$  et  $f \leq g$ , alors  $\int_a^b f(t)dt \leq \int_a^b g(t)dt$

Valeur moyenne de  $f$  sur  $[a, b]$  :  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)dt$

E. ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES (SÉRIE STL)

Équations	Solutions sur $]-\infty, +\infty[$
$y' - ay = 0$	$f(x) = ke^{\alpha x}$